

Novos registros de *Parabuteo leucorrhous* ao sul de sua distribuição e algumas considerações ecológicas

Jonas Claudiomar Kilpp^{1,2},
Gabriela Elisa Dal Pizzol¹, Amanda
Perin Marcon¹, Pedro Henrique
Garaffa¹ & Vilson Daneli Junior¹

O gavião-de-sobre-branco *Parabuteo leucorrhous* (Quoy & Gaimard, 1824) é um pequeno rapinante florestal encontrado da Venezuela e Colômbia ao norte da Argentina¹. No Brasil, distribui-se da Bahia e Minas Gerais até o nordeste do Rio Grande do Sul² onde encontra-se ameaçado de extinção na categoria “vulnerável”³.

Um indivíduo adulto (Figura 1) foi observado por JCK no dia 16/X/2013 voando entre os galhos de um florestamento de *Pinus* (27°31'90"S, 51°05'06"W; 1022 m) em Abdon Batista, Santa Catarina. Novos registros foram realizados por JCK e GEDP neste mesmo município nos dias 16/I/2014 (27°32'06"S, 51°05'30"W, 1005 m) e 11/II/2014 (27°31'58"S, 51°05'07"W; 1014 m), podendo se tratar do mesmo indivíduo nas três observações devido a proximidade dos locais de avistamento. Registramos um indivíduo adulto (Figura 2) no dia 20/IX/2014 na Floresta Nacional de Passo Fundo, Mato Castelhanos, Rio Grande do Sul (28°17'13"S, 52°11'06"W; 733 m), em voo sobre a estrada entre dois talhões de *Pinus* e pousando em um galho. A ave vocalizou por três vezes e enquanto pousada, balançou a cauda lateralmente, voando logo após por sobre a copa das árvores. Este registro amplia a distribuição da espécie no Rio Grande do Sul em aproximadamente 80 Km para oeste, sendo que neste estado tem sido verificado recentemente apenas nos Campos de Cima da Serra^{5,6,7} e em municípios da Serra Gaúcha⁸ (Figura 3).

Os quatro registros deste estudo foram realizados em áreas de plantações comerciais de *Pinus*, mesmo ambiente verificado em outros trabalhos^{8,9}. As áreas utilizadas eram florestamentos de grandes extensões, com árvores de grande porte, sendo que o talhão em Abdon Batista possui em torno de 20 anos e o da Flona de Passo Fundo, aproximadamente 40 anos. Este último apresenta um sub-bosque bem desenvolvido com a presença de árvores nativas de médio porte, além de vegetação arbustiva e herbácea. Pelo fato dos registros terem sido realizados entre setembro e fevereiro, coincidindo com seu provável período reprodutivo, estas áreas podem estar sendo utilizadas para reprodução, assim como descrito em Campo Belo do Sul, Santa Catarina⁸.

O registro desta espécie na Flona de Passo Fundo demonstra a importância desta Uni-



Figura 1. Gavião-de-sobre-branco em fragmento de *Pinus*, município de Abdon Batista/SC. Foto: Jonas C. Kilpp.



Figura 2. Registro de *Parabuteo leucorrhous* em talhão de *Pinus* na Floresta Nacional de Passo Fundo, município de Mato Castelhanos/RS. Foto: Amanda P. Marcon.




Figura 3. Registros de *Parabuteo leucorrhous* no Rio Grande do Sul e registro recente em Santa Catarina (círculos: este trabalho; 1 - Mato Castelhanos; 2 - Abdon Batista) (quadrados: registros anteriores^{5,6,7,8}; 3 - Guaporé/Dois Lagedados; 4 - Caxias do Sul; 5 - Canela; 6 - Taquara; 7 - Maquiné; 8 - São Francisco de Paula; 9 - Camará do Sul; 10 - Bom Jesus; 11 - Vacaria).

versidade de Conservação, sendo um dos últimos remanescentes significativos de floresta ombrófila mista do Planalto Médio gaúcho¹⁰ e que vem sofrendo ameaças pela pressão do cultivo de monoculturas no entorno e pelas sucessivas invasões por populações indígenas, que reivindicam a área (JCK, obs. pess.).

Agradecimentos

Aos gestores da Floresta Nacional de Passo Fundo Adão Luiz da Costa Gullich e Remi Osvino Weirich pela logística e apoio nas atividades e aos revisores da AO pelas contribuições ao manuscrito.

Referências bibliográficas

- (1) Sick, H. (1997) *Ornitologia brasileira*; (2) Thiollay, J.M. (1994) p. 52-205. In: Del Hoyo, J., A. Elliott & J. Sargatal (eds.). *Handbook of the birds of the world*, v. 2: New world vultures to guineafowl; (3) Diário

Oficial (2014) Decreto nº 51.797 de 08 de setembro de 2014. *Lista das espécies da fauna ameaçada* www.fzb.rs.gov.br/upload/2014090911580809_09_2014_especies_ameaçadas.pdf; (4) Bencke, G.A. *et al.* (2003) p. 189-479. In: Fontana C.S., G.A. Bencke & R.E. Reis (eds.). *Livro vermelho da fauna ameaçada de extinção no Rio Grande do Sul*; (5) Voss, W.A., M.V. Petry & M. Sander (1998) *Aves do Parque Nacional dos Aparados da Serra*; (6) Mahler, J.K.F. & C.S. Fontana (2000) *Divul. Mus. Ciênc. Tecnol.* - UBEA/PUCRS 5: 129-141; (7) Wikiaves (2014) *Gavião-de-sobre-branco* www.wikiaves.com.br/gavião-de-sobre-branco; (8) Zilio, F. & A. Mendonça-Lima (2012) *Ornitologia Neotropical* 23: 51-61; (9) Kaminski, N. & A.C. Angelo (2013) *Nuestras Aves* 58: 7-11; (10) ICMBio (2011) *Plano de Manejo da Flona de Passo Fundo: Resumo executivo* www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/Resumo_exec_PF_abril_2012_Final.pdf.

¹Universidade de Passo Fundo - UPF. BR 285, CEP 99052-900, Passo Fundo, RS.
²jonekilpp@hotmail.com